

「看護微生物学 第3版」ご購入の皆様へ

この度は、本書をご購入くださいますと誠にありがとうございます。

46 頁・表 2-5 につきまして、誤りがございました。

深くお詫び申し上げますとともに、お手数ではございますが、

下記の表と差し替えてくださいますようお願い申し上げます。

医歯薬出版株式会社

表 2-5 ワクチンの種類

種 類		標準的な接種時期	接種方法	その他	
麻 疹	生	1 歳代で 1 回，小学校入学の前年に 1 回	皮 下	日本では行われていない サブユニットワクチン	
風 疹	生	1 歳代で 1 回，小学校入学の前年に 1 回	皮 下		
日本脳炎	不	3 歳から 1～4 週間隔で 2 回，2 回目の約 1 年後に 1 回，9 歳時に 1 回接種	皮 下		
黄 熱	生		皮 下		
インフルエンザ	不	流行前（秋期）随時	皮 下		
おたふくかぜ （ムンプス）	生		皮 下	HBs Ag セービンワクチン	
水 痘	生	1 歳～1 歳 3 ヶ月までに 1 回，6 ヶ月から 1 年までの間隔をあけて 1 回	皮 下		
B 型肝炎	不	1 歳になる前に 3 回	皮 下		
ポリオ	不	生後 3 ヶ月から 3～8 週間隔で 3 回，3 回 目の約 1 年後に 4 回目を接種	経 口		
腸チフス	不		皮 下		
コレラ	不	随時	皮 下		
三種混合	不	生後 3 ヶ月から 3～8 週間隔で 3 回，3 回 目の約 1 年後に 4 回目を接種	皮 下		
ジフテリア	不				
百日咳					
破傷風					
狂犬病	不	随時	皮 下	（管針法）	
B C G	生	生後 5 ヶ月から生後 8 ヶ月未満に 1 回	経 皮		
小児用肺炎球菌	不	生後 2 ヶ月から接種可，4 週間隔で 3 回， 生後 12～15 ヶ月未満に 4 回目を接種，	皮 下		
Hib ワクチン （インフルエンザ 菌 b 型）	不	髄膜炎の予防 生後 2 ヶ月～7 ヶ月までに 4～8 週間隔で 3 回，3 回目から 7 ヶ月～13 ヶ月以上あ けて 4 回目を接種	皮 下		
HPV	不	中学 1 年生の間に 2 回接種した後，1 回 目の接種から 6 ヶ月の間隔をおいて 1 回 接種	皮 下		

生：弱毒生菌（生）ワクチン 不：死菌（不活化）ワクチン